

**Efectos Adversos:**

Hasta el momento no se han descrito efectos adversos. Sin embargo, no se recomienda el uso en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los ingredientes del producto.

**Ingestión accidental / Sobredosis:**

Hasta el momento de la elaboración de este prospecto no se ha informado de ningún caso de sobredosis. Pese a que no se prevén efectos adversos por ingestión accidental de Gelclair®, no se recomienda su ingestión.

**Presentación:**

Botella conteniendo 180 ml de Gelclair®  
Estuche de 12 sobres de 15 ml de Gelclair®

 **Fabricado por:**

Helsinn Healthcare SA,  0123  
Vía Pian Scaiolo 9, 6912 Pazzallo-Lugano-Suiza.

**Distribuido en España por:**

Laboratorios Rubió, S.A. c/ Industria, 29. Pol. Ind. Comte de Sert  
08755 Castellbisbal - (Barcelona) España

Última revisión: 08/2019

# GELCLAIR®

**Gel oral concentrado para el enjuague bucal****Descripción del Producto:**

Gelclair® es un gel viscoso especialmente formulado para ayudar en el tratamiento de los síntomas dolorosos de la mucositis en la cavidad bucofaringea. Forma una película protectora que, adhiriéndose a la mucosa de la cavidad bucofaringea, puede prevenir irritaciones posteriores contribuyendo de esta manera a un alivio rápido del dolor.

Se presenta como un gel concentrado para dilución en agua.

**Indicaciones:**

Gelclair® ayuda a aliviar los síntomas dolorosos de la mucositis en la cavidad bucofaringea. Gelclair®, utilizado como colutorio, forma una película protectora que contribuye a aliviar el dolor, suavizar las lesiones bucales incluidas las causadas por medicamentos, enfermedades, radioterapia, quimioterapia, intervenciones quirúrgicas de la cavidad bucal, úlceras traumáticas causadas por los aparatos de ortodoncia, las dentaduras y la edad.

**Ingredientes:**

AGUA, PVP, MALTODEXTRINA, PROPYLENGLICOL, PEG-40 ACEITE DE RICINO HIDROGENADO, HIDROXIETILCELULOSA, AROMA, EDTA DISÓDICO, HIALURONATO DE SODIO, SACARINA SÓDICA, ÁCIDO GLICIRRETÍNICO, CONSERVANTES (SORBATO DE POTASIO, BENZOATO DE SODIO, CLORURO DE BENZALCONIO).

**Instrucciones de uso - botella de 180 ml :**

Gelclair® debe usarse 3 veces al día o según necesidad. Evite comer o beber al menos en los 30-60 minutos posteriores al tratamiento.

Verter 15 ml de Gelclair® (1 cucharada sopera) en un vaso y añadir aproximadamente 40 ml de agua (3 cucharadas soperas). Agitar mezclando bien y utilizar inmediatamente. Enjuagar la boca durante al menos un minuto o por tanto tiempo como sea posible para recubrir la lengua, el paladar, la garganta, el interior de las mejillas y todos los tejidos orales concienzudamente. Hacer gárgaras y escupir el enjuague.

Desechar el enjuague no utilizado.

No ingerir.

En pacientes que no sean capaces de enjuagarse o hacer gárgaras (por ejemplo niños), se sugiere aplicar el producto directamente en la boca utilizando una esponja o algodón.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**Instrucciones de uso – Sobre de 15 ml:**

Gelclair® debe usarse 3 veces al día o según necesidad. Evite comer o beber al menos en los 30-60 minutos posteriores al tratamiento.

Verter todo el contenido de una monodosis de Gelclair® en un vaso y añadir aproximadamente 40 ml de agua (3 cucharadas soperas). Agitar mezclando bien y utilizar inmediatamente. Enjuagar la boca durante al menos un minuto o por tanto tiempo como sea posible para recubrir la lengua, el paladar, la garganta, el interior de las mejillas y todos los tejidos orales concienzudamente. Hacer gárgaras y escupir el enjuague.

Desechar el enjuague no utilizado.

No ingerir.

En pacientes que no sean capaces de enjuagarse o hacer gárgaras (por ejemplo niños), se sugiere aplicar el producto directamente en la boca utilizando una esponja o algodón.

**Contraindicaciones:**

El uso de Gelclair® está contraindicado en cualquier paciente con historia de hipersensibilidad conocida a cualquiera de los ingredientes.

**Precauciones y Advertencias:**

No se conocen interacciones con medicamentos u otros productos. Sin embargo, puede reducir la absorción de medicamentos sublinguales; en caso de utilizar este tipo de medicamentos consulte a su médico.

Evite comer o beber al menos en los 30-60 minutos posteriores al tratamiento.

No utilice el producto si la botella o el sobre están deteriorados o después de la fecha de caducidad.

El gel puede volverse un poco más oscuro y espeso durante su almacenamiento pero esto no afecta su eficacia o seguridad.

Conservar a temperatura ambiente y protegido de la luz solar directa.

Si no observa mejoría tras 7 días de tratamiento consulte a su médico. El tratamiento debe suspenderse después de 4 semanas.

Puede utilizarse durante el embarazo y la lactancia.

Este producto sanitario no tiene efecto sobre la capacidad de conducir o utilizar maquinaria.

No ingerir.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.